

# Frandes Cultures

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

### REGION AUVERGNE

Bulletin technique n°10 du 26/06/98 - 2 pages

## **Tournesol**

Stades: E1 à E2 voir E4.

### **Phomopsis**

Pas de changement depuis 8 jours dans l'évolution du champignon et des informations du modèle.

Info du modèle :

- Pourcentage de maturation des périthèces :
- 50% à La Ferté-Hauterive le 15/6.
- 32% à Charmes au 23/6.
- 21% à Maringues-63 au 29/6.
- 10% à Aulnat-63 au 23/6.
- 15% à Plauzat au 23/6.

Mêmes conseils que ceux du dernier bulletin. Le risque est très limité pour l'instant.

NB Additif Tableau produits autorisés sur tournesol du bulletin n°9 du 12/6:

- → SOLEYOU est homologué sur Phomopsis et
- → BANCO PLUS n'est plus homologué sur Phomopsis.

# MAÏS

Stades: 10 à 12 feuilles.

### **Pyrale**

Le vol a débuté au cours du dernier week-end à Gannay/Loire 03, Riom 63, Lempdes 43.

Postes de piègeage	Captures au 25/6
Gannay/Loire 03	3
Franchesse 03	<b>Q</b>
La Ferté Hauterive 03	0
Charmes 03	0
Riom 63	3
Saint Babel 63	0
Lempdes 43	1
Roannes Saint Mary 15	0

Avec le modèle climatique (sommation des températures en base 10 depuis le 1/1), il est nécessaire de totaliser 520 à 530° pour atteindre la date de pic de vol. A ce jour, nous atteignons 340 à 415° selon les postes en Basse Auvergne.

Somme To au 23/6 Poste Météo 416 La Ferté-Hauterive 355 Charmes 366 St-Pourçain/B 351 Lurcy-Lévis 340 Montmarault 383 Maringues 392 Aulnat 346 Plauzat 268 Aurillac

La lutte contre la pyrale est nécessaire dans la région Auvergne dans les secteurs les plus contaminés. Consulter la carte jointe.

3 possibilités existent :

l) Traitement avec les trichogrammes (tutte biologique) avec un lâcher unique à mettre en œuvre avant les pontes donc de façon urgente maintenant. Votre fournisseur a dû vous en avertir. Cette technique est à recommander dans les « secteurs sensibles » : zones périurbaines, cours d'eau, périmètres de captage... partout où les dérives des produits phytosanitaires sont possibles avec les interventions terrestres mais surtout aériennes.

- 2) Traitement avec les insecticides « liquides » (type pyréthrinoïdes) avec le pulvérisateur au stade 1m à 1.20m du maïs. A noter un risque de pullulation des pucerons avec ce type de traitement.
- Traitements type « Avertissements insecticides Agricoles » avec les microgranulés principalement positionnés en fonction du suivi de la pyrale. Il faut appliquer le produit au bon moment afin de couvrir au mieux le vol et de toucher les premières chenilles avant pénétration. Ce traitement est réalisé soit par voie terrestre ou aérienne avec d'insecticides utilisation homologués. Consulter le dépliant SPV-AGPM.

Prévisions de la période optimale à ce jour 3 au 13/7 selon la précocité des secteurs.



### Tournesol

Phomopsis : Risques limités.

### Maïs

Pyrale:
Début de vol le
-22/06, prévisions
traitements entre
-3 et 13/07.

Service Régional de la Protection des Végétaux Site de Marmilhat BP 45 63370 LEMPDES Tèl: 04-73-42-14-83 Fax: 04-73-90-83-70

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de la DRAF AUVERGNE

Le Directeur-Gérant:
Jean-François CHAUVEAU

Publication périodique C.P.P.A.P. n°2315AD ISSN n°1254.6372 Tarif: 320 F

SPV Toute

0

49245



P42

